




ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НИИ ОРГАНИЗАЦИИ И  
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

# МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ ЖЕНЩИН С НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*Бантьева Марина Николаевна, к.м.н., ведущий научный  
сотрудник*

Тула, 22-24 июня 2016


# Динамика материнской смертности в Российской Федерации




# Материнская смертность женщин с наркотической зависимостью в Российской Федерации




# Материнская смертность женщин с наркотической зависимостью по Федеральным округам



# Причины материнской смерти наркозависимых в Российской Федерации



# Сопутствующее носительство ВИЧ и ВГС




# Распределение погибших женщин по срокам гестации на момент завершения беременности

- до 12 недель (ранние прерывания беременности) - 6,1%;
- 12-21 неделя (поздние прерывания беременности) – 25,7%;
- 22-27 недель (сверххранние роды) – 15,2%;
- 28-36 недель (преждевременные роды) – 31,8%;
- 37-41 неделя (своевременные роды) – 9,1%;
- умерли беременными в сроке до 22 недель – 9,1%;
- умерли беременными в сроке 22 недели и более – 3,0%.




# Средний возраст погибших женщин





# Перинатальные исходы



# Выводы

- Число женщин с наркотической зависимостью среди умерших беременных, рожениц и родильниц имеет тенденцию к снижению.
- Наркотическая зависимость от веществ с инъекционным способом введения - патология, способная являться причиной гибели беременных женщин на любом сроке гестации и послеродового / послеабортного периодов.
- Основная причина материнской смерти у пациенток с наркотической зависимостью - септический шок как результат ангиогенного сепсиса при флегмонах и тромбофлебитах вен нижних и верхних конечностей (71,2%).
- Применение инъекционных форм наркотических препаратов сопряжено с заражением ВИЧ и вирусом гепатита С, что значительно усугубляет состояние здоровья и увеличивает риск неблагоприятного исхода.



# Выводы

- Гибель молодых, трудоспособных женщин репродуктивного возраста, обусловленная изучаемой патологией, определяет важность профилактики приёма ПАВ и пропаганды здорового образа жизни среди молодёжи.
- Высокая перинатальная смертность, заболеваемость детей, рождённых от матерей с обсуждаемой патологией, требует особого внимания к данной проблеме.
- В сложившейся в России неблагоприятной демографической ситуации, на фоне прилагаемых государством усилий по повышению рождаемости, потеря каждой женщины репродуктивного возраста, как и ребёнка невосполнима.
- Профилактика употребления психоактивных веществ среди молодёжи является одним из способов сохранения здоровья, а зачастую и жизни как потенциальной матери, так и рождающегося потомства.



*Спасибо  
за внимание!*

